




Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Solos
Ministério da Agricultura e do Abastecimento

Zoneamento pedoclimático do Rio Grande do Sul para a cultura da batata (Época de plantio - fevereiro)

Alto nível tecnológico

2000

40 0 40 80 km



LEGENDA

Classes de aptidão pedoclimática

- Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Preferencial, mas que apresentam em menor proporção, terras na classe de aptidão Não recomendada
- Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Tolerada
- Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Tolerada, mas que apresentam em menor proporção, terras na classe de aptidão Não recomendada
- Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão Não Recomendada
- Áreas com predomínio de terras na classe de aptidão não recomendada, mas que apresentam em menor proporção, terras na classe de aptidão Tolerada

CONVENÇÕES

- Áreas Indígenas
- Reservas Indígenas
- Reservas, Parques e APA's
- Áreas urbanas
- Cidades
- Rodovias
- Divisão municipal

Projeção POLICÔNICA
Datum Córrego Alegre
Estrômetro INTERNATIONAL 1909
Longitude de origem 51° WGR
Latitude de origem 30° S